

## INDIVIDUALNA OCENA TVEGANJA ZA PRENOS BOLEZNI ZARADI SPOLNEGA VEDENJA PRI KRVODAJALCU

### KDAJ KRVODAJALEC NE SME DAROVATI KRVI?

1. Krvodajalec ne sme darovati krvi, če je v zadnjih 4. mesecih (od zadnjega tveganja):

- a) imel več kot enega spolnega partnerja **in** imel analni spolni odnos,
- b) imel analne spolne odnose z novim partnerjem,
- c) imel spolne odnose z osebo okuženo s HIV, virusom hepatitisa B ali C ali s sifilisom,
- d) imel spolne odnose v zameno za plačilo,
- e) imel spolne odnose z osebo, ki si vbrizgava drogo
- f) imel spolne odnose z novim partnerjem, ki živi na območju z velikim tveganjem za prenos okužbe, ki se prenaša s krvjo.

**Odklon velja 4 mesece od zadnjega tveganega vedenja.**

2. Krvodajalec ne sme darovati krvi, če je v zadnjih 12. mesecih (velja od zadnje uporabe):

- a) uporabljal ob spolnih odnosih rekreativne droge – chemsex (metamfetamin, mefedron, GHB, GBL, viagra, amilnitrati (poppers), kokain, Rohypnol...),
- b) profilaktično uporabljal zdravila za preprečevanje okužbe s HIV pred in po izpostavitvi (PrEP- preexposure profilaksa in PEP-postexposure profilaksa).